

醫 生 顧 問

程瀚章醫師

規 則

- (一) 凡關於衛生及治療藥品等之疑難問題，均可函詢。
- (二) 每函以三個問題為限，每題不得過一百字，須用白紙書寫清楚。
- (三) 成藥須詳細分析者，恕不答覆。
- (四) 來函須具真實姓名、年齡、性別及地址。
- (五) 來函直寄上海天后宮橋洪福里程瀚章醫師收。
- (六) 答覆祇在本欄發表，不逕函復。

(一千四百十七)

問 鄙人男性，年三十三歲。平日身體瘦弱，精神不振，不能飲酒，稍飲輒醉。五年前，因左脅被人打傷，服草藥藥酒過多，以致腸胃受損。食後胃中鼓氣，消化不良，胃氣上頂膈腹，迫血上衝，頭昏耳聾，左側為甚。心臟跳躍，身體為之聳動。甚或胸部灼熱，食管內發炎。睡時必須左側，方可安眠。夜多惡夢驚張，醒則頭滯口枯。敢請有何良藥與良法可治？ Takazyme 與 Casarea 丸可服否？

蒲沂劉承芳

答 是胃粘膜炎性炎症，或已波及食管。宜先整通大便，Casarea 丸可每日服一二個。Takazyme 亦可服。 Cal-Bis-Ma 更有效。

(一千四百十八)

問 (一) 鄙人現年二十六歲，男性，未婚。體素強，愛作網球籃球等運動。十八歲時曾患蛔突炎，經剖腹手術，現毫無痛苦。惟年飯後須睡半小時，此種習慣是否胃病或係別病？ (二) 蛔突炎，將來再有復發之虞否？ (三) 現疑二十八歲

結婚，是否有礙於身體？

南京宋國樸

答 (一) 是習慣而非疾病。可徐徐矯正或夜間多睡半小時即可革除。(二) 蛔突炎，既已割除，斷無再發之理。(三) 恰好。

(一千四百十九)

問 (一) 內子現年二十四歲，結婚已四年，不育。素無他疾，在二十歲時，因故服食中藥，將胎墮下。(時胎已有五月) 是否因此不育？ (二) 鄙人咯血有年，近聞報章，載有煤油能治肺病，可服否？ (三) 小孩出牙時，頭部常燒何故？服何藥最有效？

湖南龍河口冷桂

答 (一) 或因所服藥性過猛，傷害子宮內膜，故不再受孕。(二) 無效。(三) 因兒童出牙時，消化受影響，致腸內發炎。宜用蓖麻子油十公撮內服，使通大便。並注意食物的容易消化與否，勿使溢食。

(一千四百二十)

問 (一) 內子今年二十七歲，已育三孩。今又受孕。惟每次妊娠中，精神疲倦萬分，飲食銳減，見飯生厭，但不食又餓。食後胸部即嘈雜不堪，須臥床時始可復原，此外頭痛。亦曾就醫，病狀不減。請問有無專治妊娠不適之成藥可服？蓋此等症狀，常延至產後始癒，並非如普通人只限妊娠初期二三月也。(二) 熱天小孩生痱子，尤以頭頸部叢生密聚，且每粒上有膿頭，有何藥可敷用「來沙爾」洗浴有效？否或另有特效藥？

南京常次風

答 (一) 可在症狀未消除際內服鹼性劑如 Cal-Bis-Ma, Citrocarbonate 之類。並注射卵巢黃體製劑 (Corpus luteum)。(二) 於浴湯中加「來沙爾」少許洗浴。手巾都須煮過後使用。浴後撒以滑石粉或爽身粉。

(一千四百二十一)

問 (一) 鄙人男性，年十六歲，身體強健，素無疾病。惟每逢夏季，身上常有像嬰孩所吸乳母後之氣味，請問以何法治之？ (二) 鄙人洗頭與游泳時，兩耳入水。現兩耳內皆流膿

狀物，請問此膿狀物在耳有無障礙？並示治療方法！

南充袁競業

答 (一) 是汗液和皮脂分泌後，因天氣熱而起分解，

成一種揮發性氣體之故。大概脂肪分解後的氣體，含有芳香酸類，和嬰兒皮膚相同，所以有這種氣味。可常用肥皂洗滌，(二) 因細菌侵入耳道之故，宜用雙氧水洗耳，滴入硼砂甘油。

(一千四百二十二)

問 (一) 家父年五十歲，體胖。近年來忽患一病。病發

作時，臉色驟變，四肢麻木，呼吸困難，只聞出氣。每月或數月一次，每次最多一小時。病去，即如平時。請問是何病症？何藥可治？(二) 內子年三十歲，月經每隔二三月一次，無定時，已生育五孩。平日患便秘，三四日始大便一次。兩年來，患足手掌心發癢，常頭昏痛，故體日瘦弱，不知為何經不調尚能生育，便閉應服何藥？

四川雅安陳毅

答 (一) 恐血壓過高之故，須檢查血壓。若不加治，有

中風之危險。藥品可服 Theominal。日常宜禁飲酒。(二) 可請婦科專家診治。至便秘，則服 Alophen pills，每日一粒。

(一千四百二十三)

問 鄙人目患近視，見報所載之『近字眼鏡矯正器』，甚

欲一窮其究竟。請問 (一) 如果是突眼，用此近視矯正器，真能矯正無他慮否？(二) 何以見多數說近視眼是不可治者。然則另有他故否？(三) 此器對於遺傳性者無礙否？

答 報章所載的廣告，不免誇張。(一) 未必有效。(二) 近

視眼的矯正，祇有配準確的凹透鏡片，即近視眼鏡戴用。(三)

所謂矯正器，無非長時壓迫眼球，使減少凸度，但沒有標準，怎樣能預測其所加壓力的限度呢？

(一千四百二十四)

問 鄙人現年二十歲，男性。面部及鼻樑上生有許多黃色小斑點，曾擦過一些成藥，無效。請問宜用何法療治？並其起因為何？

四川南充李明

答 這是少年時代面部必有之面皰。原因是皮下脂腺的分泌過多，鬱阻於毛孔內而起。療法，在乎每日除去過多的皮脂，勿使阻塞，就可消除。用硫黃藥皂洗面有確效。

(一千四百二十五)

問 鄙人現年二十三歲，女性。二年前時有心悸、頭眩、失眠、健忘、記憶力漸減等現象。經多數醫師診斷謂係神經衰弱，而非血虧。服藥良多，至今未愈。今欲以某種成藥治，未識能介紹一種否？

李瑜珍

答 試注射 Visco-Serum。能治神經衰弱 Tonophosphen 亦宜。

(一千四百二十六)

問 鄙人年三十二歲，男性，素體瘦弱。今春患牛痛，醫治半載始愈。惟精神疲倦，稍有勞神，牙部或牙床輒腫脹不舒。此狀與平常牙痛不同，因與咀嚼無礙，恐係內部虛弱所致。如服魚肝油等滋補，以胃口薄弱，不能消化。應常服何種藥物，方能治療？

南京李稼孫

答 是齒齦充血腫脹之故，與大便秘結有關，並非虛弱。

可用食鹽水漱口，內服輕瀉劑如 Agarol, Casarea bag-Rols 丸之類，一日一次即可。

(一千四百二十七)

問 (一) 鄙人年二十三歲，男性。幼時說話異常清爽，五年前大病一場，愈後，往往言語不能出聲，極感苦悶。惟以習慣法自養，雖已稍愈，究難全癒。有無藥品可服？應另外如何設法治療？(二) 鄙人大病愈後，血症時發，體力毫無，但外觀亦不弱，目斷為血不循路，溢而上行。每日傳習內家拳資修養。有無裨益？

湘邵何可庵

答 (一) 係聲帶受病的影響，致伸縮無力而起。療法，可每日用二%鹽酸鈣水洗咽喉。(二) 並非血虧，大概係肺力不足之故。若血不循路，必起出血。每日行深呼吸半小時，有效。

(一千四百二十八)

問 鄙人年二十五歲，男性。(一) 肌黃肉瘦，飯量如常。但稍進生冷水果或炒花生之類，即患熱症，醒後乃口中作苦，舌起苔，兩唇起痂。若服以 Aspirin 等，熱乃退，半熟蛋或油膩品，若多食些，腹內即起雷鳴，並瀉洩。尤以生椰子汁或椰子肉，稍進少許，胸膈即覺悶悶，右眼球作痛，視力散亂昏花。是何病症，有形成肺癆的可能否？(二) 鄙人大腿生上頑癬，已數年，不愈亦不擴大。搽遍市售藥水，均無效。請問：何藥可愈？(曾聞：治頑癬可配合百分之五的黃降汞油膏塗布。未悉「黃降汞油膏」如何配合？)(三) 堂弟年二十四歲，身強壯。去月在門前閒坐，忽然昏暈跌倒地上，移時方醒。此症在二年前曾發生一次，是在大病新愈之後所見。請問：此是何症？便

如何醫治？

荷屬吧李利朱維近

答 是消化不良症。應切戒雜食，每天食正規的食品，須準規定時間。內服 *Cascara sagrada* 丸，一日一次，並於食前服 *Caripieptic liquid* 一茶匙，以助消化。(二)可塗黃

降赤油膏，用黃降赤 (*Hydrargyrum oxide*) 一分，蠟脂 (*Vaselin*) 二十分調成。(三)是一時腦貧血，平臥即愈。平時可服鐵質補血劑如 *Bland pills* 之類，或注射肝浸膏。

(一千四百二十九)

問 (一)鄙人男性，現年四十六歲。僑居非島山頂。近二三年來，冬季常患咳嗽氣喘多痰。所吐之痰皆白，每月皆有此外，食冷物亦起。發作時不能言語，寸步難行。經多次醫治，總未見效。請問有何藥可使其斷根？(二)有威男性，年十八歲。每於下午四時至六時，即腹痛，經數年，時起時止。大概腹飢時即痛，痛處在腹正中，但一經食飯後即愈。飢後又起。請問：此為何病？宜用何藥醫治？

菲列濱李雅府

答 (一)係支氣管喘息症。欲斷根，必須遷居山下。發作時可內服麻黃素或注射 *Cardiazol* *Ephedrin*, *Ast-humolysin* 等劑有確效。(二)是胃潰瘍症。由於胃酸過多及血液循環不良而起。可注射 *Histidine hydrochloride*。

(一千四百三十)

問 (一)鄙人男性，未婚，現年十八歲。身體不過百磅。自幼染不良習慣，至今難除。未知用何方法或藥品可除此惡習？(二)神經衰弱，面黃肌瘦。未知用何藥品，或方法使體加重？

非島僑商李孤清

答 (一)宜於每晚睡前行運動，使身體疲倦後，再行冷水摩擦，然後安睡。天明即起，仍行運動半小時。(二)可常服魚肝油，並注射 *Tonophosphen*。

(一千四百三十一)

問 鄙人男性，二十三歲，患肺病。去年七月入醫院醫治。九月底又患腹脹。靜臥不動，腹漸軟消，如稍動或翻身即又發脹。大便後亦脹，脹之程度與大便之難易成正比例。大便或每日一次，或隔一、二日。食慾頗佳，惟只能吃一碗飯。飯後更脹，吃一塊餅後亦較前為脹，靜睡後略鬆。腹處有時能走動，走動時腹中較舒服。胸腹之間亦常脹悶。醫云此病與肺病無關，曾服瀉藥，殺蟲藥(大便秘驗無蟲)及 *Fesol* *Taka Diastase* 各一瓶均無效。請問：(一)此是何種疾病？應服何藥？(二)飲食應如何攝養？忌食何物？宜食何物？(三)此病已將一年，能痊愈否？

南昌揭沁之

答 (一)是腸內氣體蓄積過多，由於消化不良而起。服血炭末大量有效。(二)忌食炭水化合物，如米、麵、糖等，均以少含為是。蛋白質如肉類等，不妨。每日宜整通大便。(三)能注意飲食，多行運動使消化健全，不難恢復。

(一千四百三十二)

問 鄙人男性，十八歲。一星期前，左側臀部近肛門旁，忽生一小紅粒，坐時覺疼痛。後數日，逐漸腫大，已約有一銀元大的肉塊，色紅腫，坐時不能着墊而痛。昨早上潰一孔，流出膿血，復徐徐擠下不少，肉塊漸小，但尚有存留中間若干塊，未完全消除。時泄出一、二滴。請問是為何症？以何法治之？

上海朱澤民

答 在初起時這是普通膿癰，但因部位進肛門，不易收口。須請外科醫師切開排除內容後，使創口完全癒合。否則，將來有成痔瘻之虞。

(一千四百三十三)

問 (一)鄙人年十八歲，男性，未婚。年前因時疫得腦膜炎，雖慶獲愈，但聽器官從此失調。年來幾經就中西醫皆無效，有謂聽神經已壞，有謂耳膜肥腫，阻塞聽聞，有謂腎虛所致，等等原因，其衷一是，但究不知有何藥品能治療此頑細之耳聾也。(未知各種耳聾補聽器，有效否？)(二)鄙人頸項間生有瘰癧結核數顆。想係肺部有病所致。應用何藥消除？

李稼

答 (一)患腦膜炎後，聽神經往往損壞，絕對無法可治。這是腦內病變，根本和耳膜無關，至腎虛之說，尤屬荒誕不經。(耳聾補聽器等，一律無效。)(二)係頸淋巴腺腫，可服魚肝油及葡萄糖酸鈣，久服有效。

(一千四百三十四)

問 鄙人男性，現年二十四歲，無嗜好。二十二歲時，秋季忽發胃病，其症狀為食後約二、三小時發胃痛，痛狀如刀針之刺割，又略似灼熱之狀。頗覺難受。當痛時，不論何物食之，其痛即愈；甚至溫水飲之，亦能止痛，但隔不多時，其痛又發。在當時，經西醫之醫治，據言：為胃酸過多症，約經月餘時間之醫治，才愈。大概當時所用藥品多以 *Sodium Bicarbonate* 之類，且以麵包代米飯。自此之後，每年秋季初常再復發，不過其痛甚微，經服兩三次藥品即愈。二十五年秋又復發，其症狀與前者相似，但所服藥品數量頗多，則未覺全愈，時痛時愈，甚覺困苦。

113390

難受，精神及物質損失不少。若遇功課忙時，其痛則增劇，在假期則覺甚微。

(一) 此病應食何藥？其配方如何？

(二) 應如何攝生？忌食何物？宜食何物？

(三) 能否絕根？其法如何？對來影響身體否？

林逸舟

答 (一) 這確是胃酸過多，且已成胃潰瘍。服藥不外鹼性劑，其中以 Citricarbonate 或 Cal-Bis-Ma 爲良。重碳酸鈉不甚合宜。(二) 忌食濃粉糖類，酸味食物。多食蛋白質如肉類卵類等。(三) 注射 Laroctidin 可以絕根。於身體無害。

(一千四百三十五)

問 家父現年五十六歲，體格素健。近患頭暈症，看書報後較甚。經中西醫醫治及打 Optanon 十二西，皆無效。血壓亦不高。請問：(一) 該症是否係腦溢血，抑神經衰弱？(二) 不知有何特效藥品？(三) 不治有無危險？

蘇州顧義諒

答 (一) 大概血壓有異常，試再檢查。並非神經衰弱，但尚無腦溢血的危險。(二) 可每日使大便通順，多散步，少用腦，戒憤怒。(三) 尚無危險。但不治有令血壓過高而起腦溢血(即中風)之慮。

(一千四百三十六)

問 鄙人男性，年十六歲足。(一) 今春乳部突然腫脹，

有核似細石，在乳之基部皮膚內觸物，異常痛苦。請問：此是何疾？用何藥可以醫治？(二) 鄙人面部生雀斑，應用何藥治之？

(三) 鄙人皮膚粗糙，可服何藥，使之轉變爲細膩？

浙江台州吳時賓

答 (一) 這是在春機發動期時，乳腺變化的現象，是生理而非病理，不必醫治。若腫脹甚，可用 Antiphlogistine 溫熱。(二) 雀斑，無藥可除。(三) 皮膚粗糙，試注射 Arsylen。

(一千四百三十七)

問 (一) 鄙人二十二歲，男性，未婚。去歲冬天，鼻尖變紅，且又生硬狀紅點。如洗臉摩擦時則更加紅，且易破裂流血。將血擦去後，只餘黏液白水。請問：是何原因？用何藥可以醫治？

鼻紅？又喝酒與吃辣椒與鼻紅有關係否？(二) 大便後，每易帶血。經醫生檢查，謂係「大便乾燥，肛門破裂」。服菓子鹽使大便變成稀薄，然仍未見效。請問應如何醫治？(三) 陰阜及兩旁間奇癢，不知何故？常用水洗，亦未見癒。足趾間亦然。請問應用何藥可以醫治？

江蘇灌雲曾文範

答 (一) 有成酒癮鼻之虞。可常用硫黃皂洗面，並宜用冷水洗面。戒飲酒及吃辣椒。(二) 確係「大便乾燥，肛門破裂」。菓子鹽不如內服油類輕瀉藥爲宜。如 Epsol, Agarol 都有良效。(三) 可塗布 Mitigal 即愈。

江蘇灌雲曾文範

問 (一) 初生彌月之小孩，如患慢性支氣管炎，可否

(一千四百三十八)

投以如下之藥方，即：dy. Codein 0.3 與 Pg. ad. 5.0 (即可待因糖漿。〇三公撮水五公撮 Coft. Sod. benzo 0.2 (安思香酸鈉咖啡因〇二克)。(二) 急性氣管炎與慢性氣管炎之別，是否一有熱度，一無熱度？亦有無熱度之急性氣管炎否？鄙人之男孩，甫屆彌月，即患咳嗽，多痰，但體溫僅三七。〇其所患者究係慢性支氣管炎或急性支氣管炎？抑所謂毛細支氣管炎？

吳載峯

答 (一) 可待因，對於初生嬰兒，不可用。安思香酸鈉咖啡因分量亦大，此方切不可亂投。(二) 是普通的感冒，祇須保溫，勿受寒冷，出汗後勿遇風，即可自愈。嬰兒感冒，勿藥爲妥。

(一千四百三十九)

問 (一) 產科醫所用產婦腹部及陰部之局部麻醉劑，及產後內服之「掃血劑」，究屬何種藥名？因彼等恒祕不告人也。(二) 女性當經絕期間，經期無常，每值經至時常發劇烈頭痛，痛徹至頂，此係何病，宜服何藥？請示知！(三) 男性年五十歲，嗜酒三十餘年，現時足部往往紅腫，則痛入骨髓，俗稱腫火脚，宜用何藥敷治？或內服？

四川會理蘇仙集

答 (一) 局部麻醉劑，無效，恐係潤滑的油類。所謂內服掃血劑，是麥角製劑，即麥角流浸膏。(二) 是經絕期的變化。可注射卵巢內分泌素製劑，如 Oroglandol 之類。(三) 恐心臟已受酒精的毒害。應即戒酒。請醫處方治心臟病。